

USG jamy brzusznej – przygotowanie do badania

- Pacjent nie może nic jeść co najmniej przez 6 godzin przed badaniem, może pić płyny obojętne (woda niegazowana, słaba herbata). Gdy badanie jest planowane rano wówczas pacjent musi być na czczo.
- Godzinę przed badaniem należy wypić 3 szklanki obojętnej płynu (woda niegazowana , słaba herbata) i po wypiciu nie należy korzystać z toalety (do badania powinien być wypełniony pęcherz moczowy).
- Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy lub wyniki innych badań dotyczących tego problemu.

USG jamy brzusznej – przygotowanie do badania

- Pacjent nie może nic jeść co najmniej przez 6 godzin przed badaniem, może pić płyny obojętne (woda niegazowana, słaba herbata). Gdy badanie jest planowane rano wówczas pacjent musi być na czczo.
- Godzinę przed badaniem należy wypić 3 szklanki obojętnej płynu (woda niegazowana , słaba herbata) i po wypiciu nie należy korzystać z toalety (do badania powinien być wypełniony pęcherz moczowy).
- Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy lub wyniki innych badań dotyczących tego problemu.

USG jamy brzusznej – przygotowanie do badania

- Pacjent nie może nic jeść co najmniej przez 6 godzin przed badaniem, może pić płyny obojętne (woda niegazowana, słaba herbata). Gdy badanie jest planowane rano wówczas pacjent musi być na czczo.
- Godzinę przed badaniem należy wypić 3 szklanki obojętnej płynu (woda niegazowana , słaba herbata) i po wypiciu nie należy korzystać z toalety (do badania powinien być wypełniony pęcherz moczowy).
- Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy lub wyniki innych badań dotyczących tego problemu.